

มาตรการด้านการวินิจฉัยดูแลรักษา และ ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

มาตรการด้านการวินิจฉัยดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล



- 1) ลดจำนวนผู้ป่วยที่ไม่รุนแรงด่วน ที่มารับบริการในโรงพยาบาล ให้จัดบริการไกล่บ้าน
- 2) เสริมความเข้มแข็ง **ARI Clinic (คลินิกไข้หวัด) แบบOne stop service** ในโรงพยาบาลทุกระดับ
- 3) บูรณาการความพร้อมของเตียงในการรับผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลทุกภาคส่วน กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เหล่าทัพและตำรวจ รวมถึงจัดระบบส่งต่อร่วมกับภาคเอกชน (อาจพิจารณาใช้สถานที่ของเอกชนรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ)
- 4) **ใช้แนวทางการวินิจฉัยและรักษาร่วม (กลาง)** เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเครือข่าย
- 5) **สำรวจ และสำรอง ยา เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ รวมถึง อุปกรณ์ป้องกันตนเอง : PPE (Personal Protective Equipment)**
- 6) **เตรียมการจัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม ในระยะต่อไป**
- 7) **การสร้างขวัญกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัติงาน**



แนวทางคัดกรองผู้ป่วย ณ ARI & fever clinic



1. ผู้ป่วยที่มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) และมีประวัติในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มมีอาการ คือ

- เดินทางไปหรือมาจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของ COVID-19 หรือ
- ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของ COVID-19 หรือ
- มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
- เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน COVID-19 โดยไม่ใส่ PPE ที่เหมาะสม
- มีประวัติไปในสถานที่ที่ประชาชนหนาแน่นที่พบผู้ป่วยยืนยันในช่วงเวลาเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประกาศ

2. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้


- มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 หรือ
- เป็นบุคลากรทางการแพทย์ หรือ
- เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ และ รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ใน 48-72 ชั่วโมง หรือ
- เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่มีลักษณะเข้าได้กับ COVID-19 เช่น consolidate หรือ ground glass ทั้ง 2 ข้าง บริเวณ peripheral หรือ Bilateral หรือ sub-pleural based และ lymphopenia

3. ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน


- กรณีเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกันในช่วงสัปดาห์เดียวกัน
- กรณีในสถานที่เดียวกัน (ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์) ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในช่วงสัปดาห์เดียวกัน เชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา



COVID-19



แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 และการให้ยาต้านไวรัส



21/03/2020

